

Link do produktu: <https://www.aptekaprima.pl/heltiso-care-antiafti-zel-na-afty-10-ml-p-878.html>

HELTISO CARE ANTIAFTI Żel na afty 10 ml



Cena	9,45 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6945
Producent	Medicinae Sp. z o.o.
Rodzaj	Wyrób medyczny

Opis produktu

Heltiso Care ANTIAFTI żel na afty to specjalistyczny wyrób medyczny do stosowania w jamie ustnej w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych z występowaniem zmian takich jak afty, pleśniawki, drobne urazy, stosowanie wyrobu zapewnia ochronę zmian przed podrażnieniami. Wyrób tworzy warstwę ochronną, łagodzi ból, stanowi barierę przed czynnikami infekcyjnymi oraz podrażnieniami dla zmienionych miejsc w obrębie jamy ustnej. Aplikator umożliwia łatwą i higieniczną aplikację wyrobu, która zapewnia wysoki komfort stosowania. Długo utrzymuje się w miejscu aplikacji.

Wyrób medyczny jest zalecany w przypadku wystąpienia: aft (owrzodzeń aftowych), aftowego zapalenia jamy ustnej, pleśniawek, drobnych urazów, w tym urazów spowodowanych przez aparaty ortodontyczne i źle dopasowane protezy stomatologiczne.

Po aplikacji wyrobu na zmienione chorobowo miejsce w obrębie jamy ustnej następuje wytworzenie nawilżającej powłoki ochronnej, utrzymującej się w miejscu aplikacji, która łagodzi ból. Wytworzona powłoka pokrywa zmiany w jamie ustnej chroniąc ją przed czynnikami infekcyjnymi i podrażnieniami mechanicznymi.

Skład:

woda oczyszczona, glikol propylenowy, poliwinylpirolidon, polioksyetylenowany 40 molami tlenu etylenu uwodorniony olej rycynowy, guma ksantanowa, sorbinian potasu, sól sodowa kwasu hialuronowego, kwas glicyryzynowy, sacharynian sodu, chlorek benzalkoniowy.

Sposób użycia:

Przed zastosowaniem wyrobu dokładnie umyć ręce. Stosować miejscowo. Zdjąć zabezpieczenie aplikatora i umieścić szyjkę aplikatora w jamie ustnej. Aplikować 1 lub 2 krople żelu punktowo na zmianę w jamie ustnej. Unikać bezpośredniego kontaktu aplikatora ze zmianą. Usunąć aplikator i zabezpieczyć nasadkę.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku uczulenia na zawarte w wyrobie medycznym składniki. Nie stosować jeśli po zastosowaniu produktu wystąpią objawy swędzenia lub pieczenia, co może świadczyć o uczuleniu na składniki wyrobu medycznego wówczas należy zaprzestać stosowania wyrobu. Należy unikać przypadkowego kontaktu wyrobu ze śluzówką oka. W przypadku pogorszenia stanu błony śluzowej jamy ustnej, nasilenia objawów należy skontaktować się z lekarzem specjalistą. Chronić przed dziećmi. Nie stosować po upływie terminu ważności. Nie używać jeśli przed pierwszym otwarciem opakowanie jest uszkodzone lub naruszone. Nie używać wyrobu w przypadku uszkodzenia aplikatora. Ze względów higienicznych zaleca się używanie jednego wyrobu przez jednego pacjenta.

Produkt przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 1. roku życia. U dzieci wyrób stosować pod nadzorem osoby dorosłej.

